

ZAŠTITA OD BOLESTI



FUNGICHEL

Za preventivno i kurativno suzbijanje truleži korijena (*Phytophthora* spp.) te venuća (*Fusarium* spp.) sistemom kap na kap u dozi od 3,0-5,0 l/ha, u proljeće kretanjem vegetacije. Ponoviti 2-3 puta svakih 20 dana.

BEZ
KARENCE







BOTRYNE

Za preventivno i kurativno suzbijanje sive plijesni (*Botrytis cinerea*) u količino od 2,5 kg/ha početkom cvatnje, u punoj cvatnji, početkom zriobe i u zriobi.

BEZ
KARENCE

JAGODA

PRIHRANA BIOSTIMULATORIMA

KRETANJE VEGETACIJE U PROLJEĆE	POJAVA CVJETNIH PUPOVA	CVATNJA	POJAVA ZELENIH PLODOVA
 <p>Svakih 15 dana: CITOQUIN MIX 2,0 l/ha (folijarno); 4,0-5,0 l/ha (kap na kap) + GROWCAP 3,0-4,0 l/ha (folijarno)</p>	 <p>CITOQUIN MIX 2,0 l/ha (folijarno); 4,0-5,0 l/ha (kap na kap) + TRIXBOR 2,0 l/ha (folijarno)</p>	 <p>CITOQUIN MIX 2,0 l/ha (folijarno); 4,0-5,0 l/ha (kap na kap) + ENERMAX 0,4 kg/ha (folijarno) + GROWCAP 3,0 l/ha (folijarno)</p>	 <p>Svakih 10 dana: DELTAQUIN 2,5 l/ha (folijarno) + ENERMAX 0,4 kg/ha (folijarno) + ACTIV Ca 3,0 l/ha (folijarno); 6,0-8,0 l/ha (kap na kap)</p>

