

## ZAŠTITA OD BOLESTI



### FUNGICHEL

Za preventivno suzbijanje plamenjače (*Peronospora parasitica*) i crne pjegavosti (*Alternaria brassicicola*) u količini od 1,5 l/ha, u vrijeme kada su uvjeti za pojavu bolesti povoljni, svakih 15- 20 dana.






### FUNGICHEL

Za preventivno suzbijanje bakterijske truleži (*Xanthomonas* spp.) u količini od 1,5 l/ha, u vrijeme kada su uvjeti za pojavu bolesti povoljni, svakih 15-20 dana.



## KUPUSNJAČE

### PRIHRANA BIOSTIMULATORIMA

SADNJA	VEGETATIVNI PORAST	FORMIRANJE GLAVICA
 <p><b>Odmah nakon presađivanja</b></p> <p><b>STIMCAP</b> (folijarno 2,0 l/ha, kap na kap 3,0-4,0 l/ha) + <b>CITOQUIN MIX</b> (folijarno 1,5 l/ha; kap na kap 4,0-5,0 l/ha).</p> <p><b>Nakon 10-15 dana</b> <b>STIMCAP</b> (folijarno 2,0 l/ha, kap na kap 3,0-4,0 l/ha) + <b>CITOQUIN MIX</b> (folijarno 1,5 l/ha; kap na kap 4,0-5,0 l/ha) + <b>GROWCAP</b> (folijarno 3,0-4,0 l/ha)</p>	 <p><b>CITOQUIN MIX</b> (folijarno 1,5 l/ha; kap na kap 4-5 l/ha) + <b>GROWCAP</b> (folijarno 3,0-4,0 l/ha) + <b>TRIXBOR</b> (folijarno 2,0 l/ha)</p>	 <p><b>DELTAQUIN</b> 2-3 puta folijarno 2,0 l/ha + <b>GROWCAP</b> (folijarno 3,0-4,0 l/ha) + <b>TRIXBOR</b> (folijarno 2,0 l/ha)</p>



#### NEDOSTATAK KALCIJA

**GROWCAP**  
(folijarno 3,0-5,0 l/ha) ili

**ACTIV Ca**  
(folijarno 2,5-3,0 l/ha)