

LISNATO POVRĆE (SALATA, BLITVA, ŠPINAT)

PRIHRANA BIOSTIMULATORIMA

SADNJA	VEGETATIVNI PORAST	RAZVOJ GLAVICA	ŠPINAT, BLITVA NAKON BERBE
 <p>Odmah nakon presađivanja: STIMCAP (folijarno 2,0 l/ha, kap na kap 3,0-4,0 l/ha) + CITOQUIN MIX (folijarno 1,5 l/ha; kap na kap 4,0-5,0 l/ha).</p> <p>Nakon 10-15 dana: STIMCAP (folijarno 2,0 l/ha, kap na kap 3,0-4,0 l/ha) + CITOQUIN MIX (folijarno 1,5 l/ha; kap na kap 4,0-5,0 l/ha) + GROWCAP (folijarno 3,0-4,0 l/ha)</p>	 <p>Svakih 8-10 dana CITOQUIN MIX (folijarno 2,0 l/ha; kap na kap 4,0-5,0 l/ha) + GROWCAP (folijarno 3,0-4,0 l/ha)</p>	 <p>Svakih 10-15 dana (folijarno) DELTAQUIN 2,0 lit/ha + GROWCAP 3,0-4,0 lit/ha</p>	<p>(Folijarno) CITOQUIN MIX 2,0 l/ha + DELTAQUIN 2,0 lit/ha + GROWCAP 3,0-4,0 lit/ha</p>
			<p>NEDOSTATAK KALCIJA GROWCAP (folijarno 3,0-5,0 l/ha) ili ACTIV Ca (folijarno 2,5-3,0 l/ha)</p> 

ZAŠTITA OD BOLESTI



FUNGICHEL

Za preventivno suzbijanje plamenjače (*Bremia lactucae*) i bakterioza (*Pseudomonas* spp, *Xantomonas* spp.) folijarno, u dozi od 1,5 l/ha uz utrošak vode od 600 lit/ha. Tretiranja započeti kada su uvjeti za pojavu bolesti povoljni svakih 10-20 dana (ovisno o klimatskim uvjetima i intenzitetu zaraze).

BEZ
KARENCE



BOTRYNE

Za preventivno i kurativno suzbijanje uzročnika sive plijesni (*Botrytis cinerea*) folijarno, u dozi od 2,5-3 kg/ha uz utrošak od 600 lit vode/ha. Sa tretiranjima započeti 10-tak dana nakon presađivanja svakih 10-15 dana (ovisno o vremenskim uvjetima i intenzitetu zaraze).

BEZ
KARENCE

