

ZAŠTITA OD BOLESTI



FUNGICHEL

Za preventivno suzbijanje plamenjače (*Peronospora destructor*), pjegavosti (*Alternaria* spp.) i bakterioze (*Pseudomonas* spp.) u vrijeme kada su uvjeti za pojavu bolesti povoljni svakih 15-20 dana.

BEZ
KARENCE






BOTRYNE

Za preventivno i kurativno suzbijanje uzročnika sive plijesni (*Botrytis cinerea*) folijarno, u količini od 2,5 kg/ha od razvoja 2 lista, 2-3 puta svakih 10-14 dana.

BEZ
KARENCE

LUKOVIČASTO POVRĆE

PRIHRANA BIOSTIMULATORIMA

1-2 LISTA	VEGETATIVNI PORAST 3-4 LISTA	POČETAK RAZVOJA GLAVICA	NALIJEVANJE GLAVICA
 <p>Folijarno</p> <p>STIMCAP 2,0 l/ha + CITOQUIN MIX 1,5 l/ha</p> <p>Nakon 10-15 dana: STIMCAP 2,0 l/ha + CITOQUIN MIX 1,5 l/ha + GROWCAP 3,0-4,0 l/ha</p>	 <p>Folijarno</p> <p>CITOQUIN MIX 2,0 l/ha + DELTAQUIN 2,0 l/ha + TRIXBOR 2,0 l/ha</p>	 <p>Folijarno</p> <p>CITOQUIN MIX 2,0 l/ha + ENERMAX 0,5 kg/ha + GROWCAP 3,0-4,0 l/ha</p>	 <p>Folijarno</p> <p>DELTAQUIN 2,0 l/ha + ENERMAX 0,5-1,0 kg/ha</p>

